

# Nieuwsbrief

## DAP Gorter

### Droge zomers,

De onafgemaakte nieuwsbrief van maart heeft een tijdje liggen wachten en hierbij de enigszins gewijzigde versie. Een goed teken dat we er niet eerder aan toe kwamen, het is gelukkig druk in de praktijk. Met alles wat nu speelt, hopen we u nog vele jaren op deze manier te mogen blijven helpen. Wij steunen de boeren!

Groetjes,

Hans, Marieke, Nicolien en Eva

### Geboorte Evi

Het is al even geleden en waarschijnlijk bent u al op de hoogte, maar bij deze nog even het officiële bericht van de geboorte van Evi. Tom en Bas zijn trotste grote broers. Over niet al te lange tijd mogen we Marieke weer terug verwelkomen in onze praktijk.



Via deze weg willen we iedereen heel erg bedanken voor de leuke kaarten en cadeaus! We genieten van de tijd samen, we zijn net terug van een heerlijke vakantie!  
Groetjes en tot binnenkort weer!

# Nieuwsbrief


## DAP Gorter

### Schape mestonderzoek en bleke slijmvliezen

De laatste maanden zijn we geconfronteerd met de snelheid waarmee een infectie met rode lebmaagworm kan optreden. Zelfs bij onze eigen schapen gaat het nog wel eens mis. De dag ervoor komen ze de biks nog vreten en de dag erna liggen ze zomaar dood of erg verzwakt in de wei.

Mestonderzoek is een goede leidraad om beginnende infecties op te sporen. Hierbij moeten we echter niet vergeten dat dit natuurlijk altijd een gemiddelde van de koppel betreft. Hoe hoger de eitelling, hoe meer kans op ernstige worminfecties in de koppel. Echter in uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat er een zeer lage eitelling van de koppel is en dat er toch een enkel dier rondloopt die al een ernstige infectie te pakken heeft. Blijf daarom altijd alert. U kunt letten op sloomheid van de dieren, de mest is meestal goed en de slijmvliezen worden bleker. Met name dit laatste is iets wat u goed kunt vergelijken tussen de dieren en wat ook in een vroeg stadium al verandert. Deze dieren kunt u dan individueel behandelen of bij twijfel even overleggen of de hele koppel moet worden behandeld. Soms kun je aan de kleur van de ogen of vulva ook al een goed idee krijgen. Verder willen we nog even aanstippen dat de cyclus van de worm met dit weer erg kort is. De eitjes die via de mest op het land komen, komen door het warme weer snel uit en

de larve kan zich makkelijk ontwikkelen. Soms zijn er dan al 3 weken na een behandeling nieuwe zieke dieren. Deze tijd is natuurlijk afhankelijk van het al dan niet omweiden na behandelen. Als de dieren nog op het besmette land lopen en direct weer besmettelijke larven opnemen, gaat het het snelst. Het mooiste is de dieren na het ontwormen een nacht binnen te houden, zodat ze daar de laatste eitjes uitpoepen en dan om te weiden naar een schoon perceel. Een alternatief is om ze direct na het ontwormen om te weiden. Dit is beter dan ze nog op het oude land te laten waar ze in 24 uur nog heel veel wormpjes kunnen opeten. Als laatste: we zien steeds meer resistentie tegen bepaalde wormmiddelen. Controleer minimaal 1 keer per jaar of het middel nog op uw bedrijf werkt door 10 dagen na de behandeling de mest te laten controleren.



# Nieuwsbrief

## DAP Gorter

### Longworm

Rond deze tijd kunnen de eerste verschijnselen van longworm weer optreden. Wees bij het jongvee alert op hoestende dieren die verder geen of weinig ziekteverschijnselen vertonen. In de melkgevende koppel kan daarnaast ook (flinke) melkgiftdaling optreden. Ook is er de mogelijkheid dit te laten controleren via de tankmelk bij de GD. De veehouders die hier inmiddels al uitslag van hebben gekregen kunnen contact met ons opnemen voor informatie en advies.



### Een gekantelde lebmaag 1

We hebben de afgelopen weken weer een aantal lebmagen geopereerd. Reden om weer even op een rijtje te zetten waar u ook alweer aan moet denken om dit te voorkomen. Een lebmaagverplaatsing ontstaat door gasvorming in de lebmaag in combinatie met een lege buik/pens. Daarom komt dit vaak voor na afkalven, meestal op ongeveer 2 weken. Risicodieren zijn koeien met slepende melkziekte of andere onderliggende oorzaken waardoor ze niet eten. Denk hierbij b.v. aan een lebmaagzweer of 'scherp in'. Met dit hete weer eten de koeien ook minder, dus extra reden om goed op te letten dat de pensvulling van de (pas afgekalfde) koeien voldoende is. Dieren die om wat voor reden dan ook matig vreten, kunt u ondersteunen met een drenchpoeder, die wij of u met de drenchpomp kunnen toedienen. Voorkom hittestress met behulp van ventileren en benevelen. Houd de koeien op het heetste deel van de dag binnen en zorg buiten voor voldoende schaduw.

### Een gekantelde lebmaag 2

Het is alweer een tijdje geleden dat we bij deze koe kwamen die, pas gekalfd, plots helemaal uit de melk was. Het vermoeden van een gekantelde lebmaag werd al snel door een onderzoek bevestigd. De maag was naar de rechterkant verplaatst. Verplaatsingen naar rechts kunnen ernstiger zijn dan naar links omdat de lebmaag naast een verplaatsing omhoog ook nog een draaiing kan maken. Je ziet dan dat de koe snel zieker wordt. De veehouder was er in dit geval snel bij wat de prognose van een operatie gunstiger maakt. Zo gezegd, zo gedaan. De voorbereidingen voor de operatie werden gedaan en 20 minuten later was de koe klaar om geopereerd te worden. De buikholte werd geopend en er kon binnenin worden gevoeld hoe groot de lebmaag was en hoe de verplaatsing lag. Was er ook sprake van een draaiing? De lebmaag was enorm groot, opgeblazen en gespannen. Bij het



# Nieuwsbrief

## DAP Gorter

verder voelen volgde er een enorme knal. Wat was dat, vroeg de veehouder? Zelf ook nog geheel verbaasd moest ik melden dat de maag uit elkaar was geklapt. Het bevoelen van de maagwand was de koe fataal geworden. Daar was geen redden meer aan. Daarop is de koe snel geëuthanaseerd.

Zo zie je maar. Wat aanvankelijk een standaard operatie zou zijn, zoals zo vaak uitgevoerd, blijkt helemaal niet zo standaard. En naast de vele gevallen waar je wel succes hebt moet je soms ervaren dat niet alles lukt en het soms ook heel erg tegenvalt. Het zijn levende wezens waar we mee omgaan en garanties voor succes zijn er niet.

### Een paard in de sloot

In een weekend werden we geroepen bij een paard dat in de sloot was beland. Het dier had de hele nacht in de sloot gelegen en was erg verzwakt. De brandweer was ook aanwezig en toen wij ter plaatse kwamen was het dier al uit de sloot gehaald. De brandweer Nederhorst had dit goed voor elkaar met een speciaal tuig wat hiervoor is gemaakt. Hierbij wordt een grote halfronde haak onder het paard door geschoven waardoor er banden onder de buik door kunnen worden getrokken. Zo kan het paard eruit worden getakeld zonder hem te beschadigen. Mocht u een keer voor de situatie staan een paard uit de sloot te moeten halen, doe dit dan niet door aan de benen of het hoofd te trekken. Het paard kan daarmee ernstig en blijvend letsel oplopen. Voor koeien geldt eigenlijk ook dat een band achter de kont of onder de buik veiliger is. Helaas hebben we in het verleden wel eens dieren moeten euthanaseren, omdat ze schade aan de nek hadden opgelopen met het uit de sloot halen.

Wat dit paard betreft: het zag er eerst erg slecht uit. Ze had slootwater binnen gekregen en was in shock. Tegen alle verwachtingen in is ze 's middags weer opgestaan en maakt ze het inmiddels goed. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!



# Nieuwsbrief

## DAP Gorter

### TOT SLOT.....

#### In 't zonnetje

We mogen weer wat mensen feliciteren! De familie Verweij uit Weesp, de familie Engele uit Weesp en Frans-Jan ter Beek uit Muiden.

| Naam                       | Vader   | Dagen | Kg melk | % vet | % eiwit | kg v+e | AV | Eigenaar              |
|----------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|----|-----------------------|
| Alles-Wisselt Melkbron 453 | Kian    | 3.607 | 100.226 | 4,50  | 3,67    | 8.188  | 84 | D Verweij, Weesp      |
| Alles-Wisselt Melkbron 463 | Gibor   | 3.211 | 101.339 | 4,07  | 3,33    | 7.499  | 81 | D Verweij, Weesp      |
| Corrie 54                  | Kian    | 3.712 | 100.587 | 4,76  | 3,74    | 8.550  | 77 | Mts Engele-Kok, Weesp |
| Terbeek Glenda 3747        | Shottle | 3.321 | 100.707 | 3,85  | 3,27    | 7.172  | 90 | F.J ter Beek, Muiden  |



Melkbron 453 en 463



Corrie 54



Glenda 3747

### Prikbord

Creëer schaduw in het weiland voor de schapen door bijvoorbeeld een oude veekar neer te zetten. Voor de langere termijn kunt u denken aan het aanplanten van heggen of boompjes. Ook paarden hebben een schaduwplek nodig op deze warme dagen.

Endex® is weer beschikbaar voor het ontwormen van uw schapen. In verpakkingen van 0,8 en 2,2 liter.

Tussen 1 september en 31 oktober is er weer een kortingsactie (50%) voor het onderzoeken van uw paard voor PPID (de ziekte van Cushing).